

| Шкала расчета стоимости твердой пшеницы (при покупке и продаже) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Характеристика | № | Критерий | Нормальный диапазон | | | | | За пределами нормального диапазона | | | |
| | | | Бонификация (+) | | | Нейтральный диапазон | Рефакция (-) (A) | | Нижнее значение | Двойная рефакция за каждый пункт, ниже допустимого минимального значения (-) (B) | |
| | | | Верхнее значение | Допустимый диапазон | Формула | | Допустимый диапазон | Формула | | | |
| Физические | 1 | Удельный вес, кг/г | Н Е Т | | | ≥78 кг/г | 77,9-72,0 | (цена пшеницы*10%)*(78-удельный вес) | 72 | ((цена пшеницы*10%)*(72-удельный вес))*2 | |
| | 2 | Влажность, % | 9 | 9,0 - 10,9 | (цена пшеницы*10%)*(11-влажность) | 11-14 | Н Е Т | | 14 | О Т К А З | |
| | 3 | Примеси, % | | | | | | | | | |
| | 3-1 | Битые зерна | | | | 0-2,5 | 2,6-6,0 | (цена пшеницы*5%)*(показатель-2,5) | 6 | ((цена пшеницы*5%)*(показатель-6))*2 | |
| | | Мелкие зерна | | | | 0-4 | 4,1-8,0 | (цена пшеницы*5%)*(показатель-4) | 4 | 8 | ((цена пшеницы*5%)*(показатель-8))*2 |
| | | Зерна других растений | | | | | | | 0,5 | | |
| | | Зерно, поврежденное сушкой | | | | | | | 1,5 | | |
| | | Фузариозные зерна | | | | | | | | | |
| | 3-2 | Зерновые примеси, % | | | | | | | | | |
| | | Зерна, поврежденные вредителями/клопом черепашкой | | | | | | | | | |
| | 3-3 | Пятнистые зерна, % Зерна с окрашенным зародышем | | | | 0-3 | (цена пшеницы*5%)*(показатель-3) | | | | |
| | 3-4 | Проросшие зерна, % | | | | 0-2,5 | (цена пшеницы*5%)*(показатель-2,5) | | | | |
| | 3-4 | Различные примеси, % | Посторонние зерна | | | | 0-1,4 | 1,5-5,0 | (цена пшеницы*10%)*(показатель-1,4) | 5 | ((цена пшеницы*10%)*(показатель-5))*2 |
| | | | Вредные семена | | | | | | | | |
| | | | Чеснок | | | | | | | | |
| Пажитник | | | | | | 0,1 | | | | | |
| Плевел | | | | | | 0,1 | | | | | |
| Донник | | | | | | 0,1 | | | | | |
| Поврежденное зерно | | | | | | 0,05 | | | | | |
| Соженное зерно | | | | | | 0,05 | | | | | |
| Непосредственно повреждения | | | | | | 0,05 | | | | | |
| Спорынья | | | | | | 0,05 | | | | | |
| Зерно, поврежденное насекомыми | | | | | | | | | | | |
| Мертвые гасекомые или их части | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мучнистые зерна | | | | 0-30 | 30-70 | (цена пшеницы*10%)*(показатель-30)/3 | до 70% | Для значений выше 70% применяется та же рефакция что и для 70% | | |
| Технические | № | Критерий | Нормальный диапазон | | | | | За пределами нормального диапазона | | | |
| | | | Бонификация (+) | | | Нейтральный диапазон | Рефакция (-) (A) | | Нижнее значение | Двойная рефакция за каждый пункт, ниже допустимого минимального значения (-) (B) | |
| | | | Верхнее значение | Допустимый диапазон | Формула | | Допустимый диапазон | Формула | | | |
| 5 | Белок, % (**) | Н Е Т | | | | | | | 11,5 | ((цена пшеницы*10%)*(показатель-5))*2 | |
| Примечание: (*) Для всех значений влажности за пределами 9% применяется та же бонификация, что и для 9% | | | | | | Общая рефакция = Σ рефакций в нормальном диапазоне + Σ двойных рефакций за пределами нормального диапазона: (A)+(B) | | | | | |
| (**) Процент белка учитывается только при оценке пшеницы, продаваемой на мукомольные предприятия | | | | | | Цена на пшеницу = базисная цена на пшеницу при покупке или цена ретрессии при продаже | | | | | |