

From: Посольство России [mailto:rus.egypt@mail.ru]
Sent: Thursday, November 02, 2017 1:09 PM
To: o.zaharova@svfk.mcx.ru
Subject: О египетских требования к импортному зерну

Начальнику Управления земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна
О.В.Захаровой

Уважаемая Ольга Валерьевна,

В соответствии с поручением представляем актуализированные и фитосанитарные требования, а также требования в сфере качества и безопасности, предъявляемые египетскими властями к импортному зерну.

При возникновении вопросов просим обращаться к атташе Посольства Замуруеву Фёдору Сергеевичу (моб. 01202244579).

С уважением,

Посольство России в Египте

Вх. 5-2767

03.11.2017г.

Правила и нормы Египта, предъявляемые к качеству и безопасности импортного зерна

Показатели безопасности пшеницы

Показатель	Содержание
Предельно допустимый уровень содержания остаточного количества пестицидов	
Карбендазим	не более 0,05 мг/кг
Дифеноконазол	не более 0,2 мг/кг
Фипронил	не более 0,02 мг/кг
Имазалил	не более 0,01 мг/кг
Малатион	не более 0,5 мг/кг
Пропиконазол	не более 0,02 мг/кг
Тебуконазол	не более 0,05 мг/кг
Предельно допустимый уровень содержания микотоксинов	
Афлатоксин В1	не более 0,002 мг/кг
Афлатоксины (В1+В2+G1+G2)	не более 0,004 мг/кг
Зеараленон	не более 1,00 мг/кг
Предельно допустимый уровень содержания токсичных элементов	
Свинец	не более 0,2 мг/кг
Кадмий	не более 0,2 мг/кг
Инсектициды фосфата гидрогена	не более 0,001 мг/кг
Предельно допустимый уровень содержания диоксинов	
Дезоксиниваленол	не более 1250 мг/кг
Предельно допустимый уровень содержания ГМО – 0%	
Предельно допустимый уровень содержания биологических контаминантов	
Охратоксин А	не более 5 мкг/кг
Предельно допустимый уровень содержания радионуклидов	
Цезий– 137	Определяются Постановлением председателя совета министров Египта №1186 от 2003 г.
Стронций – 90	

Показатели качества пшеницы

Показатель	Содержание
Натура, кг/гектолитр	не менее 77
Общее число примесей, в т.ч.:	не более 5,0 %
- мелкое и битое зерно (проход сита 1,63*9,53 мм)	5,0%
- поврежденные сушкой, плесневелые, проросшие	4,0%
- в т.ч. клопом	1,0%
- поврежденные вредителями	32 шт/100 гр
- неорганические примеси	0,5%
- органические посторонние примеси, в т.ч.:	1,0% , 25 семян на 1 кг
- вредные и/или токсичные семена	0,1%
- сор (органические примеси животного происхождения)	0,1%
- вредные и/или ядовитые семена, в т.ч.	не более 0,5%
Ядовитые семена	0,05%
Головня и спорынья	0,05%
Содержание белка, %	не менее 12,5 %
Влажность, %	13 – 13,5 %
Допустимый объем поврежденных ядер зерна	32 зерна на 100 гр.
Амброзия	0%
Число падения зерна в секунду	200 зерен

Методы исследования и отбора проб:

- 1) Проверка удельного веса в соответствии с требованиями стандарта № 1-4052 или 2-4052 (Международные стандарты ISO №7971 или 2-7971);
- 2) Отбор образцов и оценка влажности происходит методами отбора образцов, определения влажности простой проверкой и определения влажности лабораторной проверкой;
- 3) Определение качества в соответствии с международными характеристиками Лайзо №7970 «Зерно пшеницы»

Нормативная документация:

- 1) Египетский стандарт 1601-1/2010 «Пшеница»;
- 2) Египетский стандарт № 2360 «О максимальном уровне содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах»;
- 3) Стандарт №1875 «О максимальном уровне содержания микотоксинов в пищевых продуктах»;
- 4) Кодекс Алиментариус (Международный комитет по пищевым продуктам);
- 5) Постановление председателя совета министров Египта №1186 от 2003 г.